

中国早期结直肠癌筛查流程专家共识意见 (2019, 上海)

国家消化系统疾病临床医学研究中心(上海) 国家消化道早癌防治中心联盟 中华医学会消化内镜学分会 中华医学会健康管理学分会 中国医师协会内镜医师分会 消化内镜专业委员会 中国医师协会内镜医师分会内镜健康管理及体检专业委员会 中国医师协会内镜医师分会内镜诊疗质量管理与控制专业委员会 中国健康促进基金会 国家消化内镜质控中心 中国抗癌协会肿瘤内镜学专业委员会

通信作者:李兆中,海军军医大学长海医院消化内科,上海 200433,Email:zhsl@vip.163.com;金震东,海军军医大学长海医院消化内科,上海 200433,Email:zhendjin@126.com;令狐恩强,解放军总医院消化内科,北京 100853,Email:linghuenqiang@vip.sina.com

基金项目:国家重点研发计划(2017YFC1308800、2018YFC1313103);国家自然科学基金(81670473、81873546)

DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2019.38.001

一、前言

结直肠癌是最常见的恶性肿瘤之一,其发病率在全球居于恶性肿瘤第3位,死亡率高居第2位,是占全球发病和死亡首位的消化系统恶性肿瘤^[1],严重威胁人民群众的生命健康。近来随着我国生活方式及饮食结构的西化,结直肠癌发病率总体呈现上升趋势^[2-4],已成为我国消化系统发病率第2位、患病率第1位的恶性肿瘤^[5-6]。2018年预计我国结直肠癌新发病例超过52.1万,死亡病例约24.8万,新发和死亡病例均接近全世界同期结直肠癌病例的30%^[7],疾病负担沉重。因此,降低我国结直肠癌的死亡率和发病率既是刻不容缓的重大临床关键问题,也是实现十九大报告中“健康中国”这一宏伟战略的具体措施。

目前我国结直肠癌5年生存率远低于美国及日韩^[8],85%以上的结直肠癌发现即已属晚期,即使经过手术、放化疗、靶向治疗等综合治疗,患者的5年生存率仍明显低于40%;相反,早期结直肠癌治疗后5年生存率可超过95%,甚至可以完全治愈。现阶段我国早期结直肠癌的诊断率低于10%,明显落后于日本(1991年早期诊断率已达到20%)和韩国(2009年已超过20%)^[8-9]。因此,为改变我国结直肠癌高发病率、高死亡率和低早期诊断率的现状,早期结直肠癌筛查措施亟待在国内推广。

欧美等发达国家已建立起较为完善的国家结

直肠癌筛查体系,我国结直肠癌筛查始于20世纪70年代^[10],目前在部分省市或地区有区域性结直肠癌筛查项目开展^[11-13]。为进一步推进我国的结直肠癌筛查计划,2019年4月13日,由国家消化系统疾病临床医学研究中心(上海)牵头,依托国家消化道早癌防治中心联盟,联合中华医学会消化内镜学分会、中华医学会健康管理学分会、中国医师协会内镜医师分会消化内镜/内镜健康管理及体检/内镜诊疗质量管理与控制专业委员会、中国健康促进基金会、国家消化内镜质控中心和中国抗癌协会肿瘤内镜学专业委员会,组织我国消化、内镜、肿瘤、健康管理和内镜质控等多学科专家,以《中国早期结直肠癌筛查及内镜诊治指南(2014年,北京)》^[14]为基础,进一步细化并确立适合我国实际情况的早期结直肠癌筛查流程,联合制定本共识意见。

二、相关概念

1. 人群筛查(mass screening):也称自然人群筛查(natural population screening)或无症状人群筛查(asymptomatic population screening),是采用标准化设计的筛查方案,进行以人群为基础的筛查。多由国家或地区相关部门统一组织,统一投入,以各种手段督促符合筛查条件的全体人群,在规定的、相对集中的时期内参与筛查。其各阶段实施遵循严格的规范,每项流程均可跟踪审查,需要占用较多资源,常需医疗保险系统支持。在检出早期癌的同

时发现并干预癌前病变,目的在于降低该人群或地区的结直肠癌死亡率和发病率。

2. 伺机筛查(opportunistic screening):也称机会性筛查或个体筛查(individual screening),是一种基于临床,针对就诊者或体检个体的筛查。依托现有医院、体检中心、社区门诊实施,无需额外资源支持,根据个体情况灵活选择筛查方式,旨在早期检出结直肠肿瘤(包括部分癌前病变),优化治疗效果,但无法判断是否可降低某一人群或地区的结直肠癌发病率。结构化的伺机筛查(structured opportunistic screening),指由官方政策支撑、医疗保险系统支持,广泛覆盖目标人群,通过各种手段推动完成并关注质量,监测结果的伺机筛查。结构化的伺机筛查以美国的广泛结肠镜筛查为典型代表,在我国尚未开展。

三、筛查目标

早期结直肠癌筛查的长期目标是降低人群结直肠癌死亡率和发病率。以美国为代表的少数发达国家,在全国范围内持续广泛推动早期结直肠癌筛查后,已观察到结直肠癌死亡率和发病率的显著下降^[15]。在我国结直肠癌危险因素增多、人口结构老龄化加快、发病率逐步上升的大背景下,从开展筛查到遏制上升趋势,进而观察到实际死亡率和发病率的下降,将是一个相当漫长的过程。考虑到我国大部分地区尚未建立完善的死亡和肿瘤登记系统,有效监控长期目标存在诸多困难。早期结直肠癌筛查的中期目标是提高早期癌在结直肠癌总体中所占的比例,降低筛查间期结直肠癌的发病率。国际上有研究将结肠镜质控指标与筛查的中期指标如间期癌联系起来^[16-17],但间期癌的定义、规范及识别在我国尚未达成广泛共识^[18-19],可操作性较弱。筛查的短期目标着眼于提高人群筛查率,提高早期结直肠癌及重要癌前病变(进展期腺瘤、广基锯齿状病变及其他伴有高级别上皮内瘤变的病变)检出率和提高结肠镜检查质量。短期指标可即时观察早期结直肠癌筛查项目的成效,便于审查及持续质量改进^[20],在我国现阶段可操作性较强。亚太结直肠癌筛查共识曾明确提出:结直肠癌筛查项目的各个环节都应进行审查和质量控制^[21],主要通过监测多个短期指标实现。

筛查的长期目标:降低人群结直肠癌死亡率和发病率。筛查的中期目标:提高早期癌在结直肠癌总体中所占的比例,降低筛查间期结直肠癌的发病率。筛查的短期目标:提高人群筛查率,提高早期

结直肠癌及重要癌前病变检出率,提高结肠镜检查质量。

推荐评估短期指标促进筛查项目质量持续改进,并酌情兼顾中、长期指标。

四、筛查模式和对象

亚太结直肠癌筛查共识建议在发病率大于30.0/10万的国家或者地区开展人群筛查。目前,结直肠癌发病率 $\geq 30.0/10$ 万的30个国家几乎都开展了基于人群结直肠癌筛查或结构化的伺机筛查,36个发病率 $\geq 25.0/10$ 万的国家均进行了人群筛查试点^[22]。随着经济社会发展,我国结直肠癌发病率持续上升,据GLOBOCAN2018数据估计,我国结直肠癌年龄标化发病率(世界标准人口)已达23.7/10万,其中男性发病率为28.1/10万,女性为19.4/10万^[7],人群筛查的必要性和紧迫性逐渐增加。但我国人口众多,城乡、地域、经济社会发展程度差异巨大,目前尚无简易而高效的筛查手段进行全民结直肠癌普查。依据现有经验,我国结直肠癌预防知识知晓率低,人群筛查依从性不高,严重降低了筛查的效率^[11]。在各级医疗机构(医院、卫生院、社区门诊)和体检中心面向就诊者及体检个体进行的伺机筛查,简便、实用、依从性较好,能明显缩小筛查人群,节省卫生资源,是我国结直肠癌筛查的重要组成部分和有效措施,特别是在资源有限的情况下,建议集中力量开展伺机筛查。加强结直肠癌预防宣传和健康科普教育,结合当地实际情况,将人群筛查与伺机筛查有机结合,是符合我国国情的筛查模式。

结直肠癌的发病率随年龄的增长而上升,在50岁之前发病率较低,而在50岁以后呈现快速上升的趋势。大多数欧美国家把50~75岁作为结直肠癌筛查的目标年龄段。76~85岁人群根据个人健康状况和预期寿命选择是否参与筛查,85岁以上则不再建议筛查。新近,美国癌症协会(ACS)根据流行病学数据和数学模型研究,建议从45岁开始结直肠癌筛查^[23]。我国结直肠癌人群发病率从40岁开始上升速度加快,50岁以上加快更为明显^[24]。而我国人口基数巨大,依据2010年第6次人口普查数据,我国50~75岁人群总数为2.94亿人,40~44岁和45~49岁人数分别达1.25亿和1.06亿。据2012年全国消化内镜医师执业情况普查数据显示,2012年全国仅开展结肠镜583.24万例^[25],人均结肠镜资源极其匮乏。根据我国国情及结直肠癌临床流行病学资料,人群筛查建议将50~75岁作为



[REDACTED]

分别为 74.8% 和 87.4%，均高于 FIT 检测^[60]。但 mSEPT9 对于癌前病变(结直肠腺瘤、息肉及进展期腺瘤)的诊断敏感性和特异性不足，不推荐用于人群筛查，可作为个体化诊断的选择与补充。

5. 粪便丙酮酸激酶(M2-PK)检测：肿瘤细胞中 M2-PK 的过表达可促进大分子的生物合成，进而影响肿瘤增殖和转移。对 17 项研究共 12 116 例受检者的荟萃分析表明，结直肠癌患者粪便中 M2-PK 的水平显著高于健康人群，其敏感性为 80.3%，特异性为 95.2%，均明显高于 FOBT，目前尚待国内临床研究验证其筛查效果^[61]。

各种筛查方法的特点见表 1。

推荐的筛查方法：(1)FIT，推荐筛查周期为每年 1 次；(2)粪便 DNA 检测，建议筛查周期为每 1~3 年 1 次；(3)结肠镜检查，推荐筛查周期为每 5~10 年 1 次高质量结肠镜检查。人群筛查主要选用上述推荐方法；伺机筛查时，为提高筛查参与率，应结合各方法特点，充分考虑个人意愿，灵活、综合选用筛查方法。

七、结直肠癌筛查的质量控制

初筛环节的质量控制，因人群、方法差异较大，横向对比较为困难，目前建议依托筛查短期指标进行项目的纵向持续质量改进^[20]。

高质量的结肠镜检查是保证结直肠癌筛查项目成功的关键。近期一项大规模荟萃分析发现，结肠镜对腺瘤的漏诊率为 26%，进展期腺瘤漏诊率达 9%^[50]。建议在结直肠癌筛查时严格执行结肠镜检查的质控标准。

1. 合格的肠道准备比例应 $\geq 90\%$ 。研究表明，肠道准备不充分时腺瘤检出率显著降低，漏诊率显著上升^[62]。目前已有多种肠道准备评分量表，其中

波士顿肠道评分量表(BBPS)具有稳定性较高、不同肠段的评分与该肠段息肉检出率相关且方便学习、推广等优点，BBPS 评分 ≥ 6 分时可认为肠道准备充分，在国内已有多项研究验证其有效性^[63-64]。

2. 盲肠插镜率 $\geq 95\%$ 。研究表明，盲肠插镜率高于 95% 的内镜医师，其所诊治患者的结肠间期癌发病率显著低于盲肠插镜率小于 80% 的内镜医师所对应的患者^[65]。因此，在排除结肠梗阻性病变、活动性炎症性肠病、肠道准备极差等因素后，回盲部插镜率应 $\geq 95\%$ 。

3. 退镜时间 ≥ 6 min：与平均退镜时间 < 6 min 的内镜医师相比，退镜时间 ≥ 6 min 的内镜医师腺瘤检出率显著提高(28.3% 比 11.8%)^[66]；中位退镜时间为 9 min 的内镜医师其腺瘤、锯齿状息肉的检出率最高^[67]。因此推荐退镜观察时间应至少保证 6 min，适当延长退镜时间可能进一步提高腺瘤检出率。

4. 腺瘤检出率(adenoma detection rate, ADR)：ADR 被认为是与结肠镜质量最相关、最重要的指标：ADR 每增加 1%，结直肠间期癌发病风险则降低 3%，致命性间期癌风险降低 5%^[17]。欧美国家的经验表明：在 50 岁以上的无症状平均风险人群中 ADR 应 $\geq 25\%$ ，男性 $\geq 30\%$ ，女性 $\geq 20\%$ ^[68]。近期研究显示，中国人群的 ADR 约为 14%~15%^[63,69]，建议我国适龄一般人群的 ADR 目标值 $\geq 15\%$ ，其中男性应 $\geq 20\%$ ，女性应 $\geq 10\%$ 。FIT 或粪便 DNA 阳性人群的 ADR 应高于此标准。

5. 阳性结肠镜平均腺瘤数(adenomas per positive index colonoscopy, APPC)：荟萃分析发现，APPC 与腺瘤漏诊率和进展期腺瘤漏诊率均独立相关，APPC 低于和高于 1.8 时，腺瘤漏诊率分别为

表 1 我国早期结直肠癌各筛查方法的特点

筛查方法	降低发病率	降低死亡率	获益-危害比	我国普及程度	费用	适合我国伺机筛查	适合我国人群筛查
每年 1 次 FIT 检测	+	+++	+++	+++	+	+++	+++
每 5~10 年 1 次高质量结肠镜检查	+++	+++	+++	+++	++	+++	++
每 1~3 年 1 次粪便 DNA 检测	/	/	/	+	++	++	++
乙状结肠镜检查	+++	+++	++	/	/	/	/
结肠 CT 成像技术	++	++	+	+	+++	+	/
结肠胶囊内镜检查	/	/	/	+	+++	+	/
血浆 Septin9 基因甲基化检测	/	/	/	+	++	+/-	/
粪便 M2-PK 检测	/	/	/	+	+	+/-	/

注：FIT 为免疫化学法粪便隐血试验；M2-PK 为丙酮酸激酶；+~+++ 依次为，降低发病率效果(弱~强)、降低死亡率效果(弱~强)、获益-危害比(低~高)、我国普及程度(低~高)、费用(便宜~较贵)、用于我国伺机筛查推荐等级(低~高)、用于我国人群筛查推荐等级(低~高)；“/”为缺乏国内数据和在国内暂不推荐；“+/-”表示其筛查效能尚待进一步确证，一般仅用于个体化诊断


31% 和 15%; APC 低于和高于 1.7 时,进展期腺瘤漏诊率分别为 35% 和 2%,可能是潜在的结肠镜质控指标^[50]。因我国结直肠息肉切除术后病理送检情况差异较大,尚需后续研究证实。

八、早期结直肠癌筛查的建议流程

绝大多数开展结直肠癌筛查的国家或地区采用两步法筛查,在我国人群筛查也推荐采用两步法进行。通过结直肠癌筛查评分、问卷和/或常用初筛试验可筛选出高危人群。评分、问卷评定为高风险或 FIT、粪便 DNA 检测阳性者归为高危人群,其结直肠癌及癌前病变的发生风险明显升高,需接受结肠镜检查;无任一项者为非高危人群(包括部分评分系统的低风险和中等风险人群),风险相对较低,建议采取多轮非侵入筛查和定期随访策略,可优化资源配置,提高筛查效率。参考国内外的结直肠癌筛查策略,结合最新的高质量临床研究证据,建议我国早期结直肠癌人群筛查流程如图 1。对于伺机筛查,则筛查方法更加灵活,流程更体现个体化。此外,随着认识的深入,对于部分较为特殊的人群,已有细致的专题讨论:典型的结直肠癌遗传家系的癌变发生风险很高,其诊治和管理流程依照相应共识进行^[70];炎症性肠病相关肿瘤的筛查和监测不同于一般人群,参照相关共识推荐执行^[71]。结直肠癌治疗后^[72]或结直肠腺瘤切除后^[14]的个体,以往在筛查中有所涉及,应逐步纳入规范的肿瘤监测管理。

参与本共识意见制定的专家(按姓氏汉语拼音排序):白书忠(中国健康促进基金会);柏愚(海军军医大学长海医院);蔡全才(海军军医大学长海医院);柴宁莉(解放军总医院);陈刚(中国健康促进基金会健康管理研究所);陈卫昌(苏州大学第一附属医院);陈卫刚(石河子大学医学院第一附属医院);陈幼祥(南昌大学第一附属医院);党彤(包头医学院第二附属医院);杜奕奇(海军军医大学长海医院);范竹萍(上海交通大学医学院附属仁济医院);戈之铮(上海交通大学医学院附属仁济医院);郭强(云南省第一人民医院);郭学刚(空军军医大学西京医院);何兴祥(广东药科大学附属第一医院);和水祥(西安交通大学医学院第一附属医院);

洪海鸥(安徽省立医院);胡兵(四川大学华西医院);黄永辉(北京大学第三医院);姜慧卿(河北医科大学第二医院);金震东(海军军医大学长海医院);李良平(四川省人民医院);李汛(兰州大学第一医院);李延青(山东大学齐鲁医院);李兆申(海军军医大学长海医院);廖专(海军军医大学长海医院);令狐恩强(解放军总医院);刘俊(华中科技大学同济医学院附属协和医院);刘思德(南方医科大学南方医院);刘玉萍(四川省人民医院);吕宾(浙江省中医院);吕农华(南昌大学第一附属医院);梅浙川(重庆医科大学附属第二医院);任建林(厦门大学中山医院);任旭(黑龙江省医院);盛剑秋(解放军总医院第七医学中心);姒健敏(浙江大学附属邵逸夫医院);宋震亚(浙江大学医学院附属第二医院);孙明军(中国医科大学附属第一医院);王邦茂(天津医科大学总医院);王贵齐(中国医学科学院肿瘤医院);王洛伟(海军军医大学长海医院);王雯(解放军联勤保障部队第九〇〇医院);王新(空军军医大学西京医院);吴建胜(温州医科大学附属第一医院);徐红(吉林大学白求恩第一医院);徐卸古(中国健康促进基金会);许建明(安徽医科大学第一附属医院);杨玉秀(河南省人民医院);游苏宁(中华医学会继续教育部);于红刚(武汉大学人民医院);袁媛(中



注:FIT为免疫化学 E 粪便隐血试验;^a结直肠癌治疗后依据《中国结直肠癌诊疗规范(2017年版)》定期监测^[72];结直肠腺瘤/息肉切除术后监测间隔参考《中国早期结直肠癌筛查及内镜诊治指南(2014,北京)》^[14]内镜诊治部分,应尽力完成高质量结肠镜检查,若结肠镜检查质量不满意,可适当缩短监测间隔

图1 早期结直肠癌筛查的 y p 流程

国医科大学第一临床学院);曾强(解放军总医院健康管理研究院);张国新(江苏省人民医院);张升光(安徽省立医院);张澍田(首都医科大学附属北京友谊医院);赵秋(武汉大学中南医院);赵晓晏(陆军军医大学新桥医院);郑树(浙江大学);智发朝(南方医科大学南方医院);钟良(复旦大学华山医院);周平红(复旦大学中山医院);邹多武(上海交通大学医学院附属瑞金医院);邹晓平(南京大学医学院附属鼓楼医院)

主要执笔者:柏愚(海军军医大学长海医院);杨帆(海军军医大学长海医院);赵胜兵(海军军医大学长海医院);潘鹏(海军军医大学长海医院)

利益冲突 专家组所有成员均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J]. *CA Cancer J Clin*, 2018,68(6):394-424. DOI: 10.3322/caac.21492.
- Chen W, Zheng R, Baade PD, et al. Cancer statistics in China, 2015[J]. *CA Cancer J Clin*, 2016,66(2): 115-132. DOI: 10.3322/caac.21338.
- 郭天安, 谢丽, 赵江, 等. 中国结直肠癌 1988-2009 年发病率和死亡率趋势分析[J]. *中华胃肠外科杂志*, 2018, 21(1): 33-40. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-0274.2018.01.007.
- Zhang L, Cao F, Zhang G, et al. Trends in and predictions of colorectal cancer incidence and mortality in China from 1990 to 2025[J]. *Front Oncol*, 2019, 9: 98. DOI: 10.3389/ fonc.2019.00098.
- Zheng R, Zeng H, Zhang S, et al. National estimates of cancer prevalence in China, 2011[J]. *Cancer Lett*, 2016,370(1):33-38. DOI: 10.1016/j.canlet.2015.10.003.
- 郑荣寿, 孙可欣, 张思维, 等. 2015 年中国恶性肿瘤流行情况分析[J]. *中华肿瘤杂志*, 2019, 41(1): 19-28. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3766.2019.01.005.
- International Agency for Research on Cancer. China source: Globocan 2018[R/OL]. [2019-8-1]. <http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/160-china-fact-sheets.pdf>.
- Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries[J]. *Lancet*, 2018, 391(10125): 1023-1075. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)33326-3.
- Sankaranarayanan R, Swaminathan R, Brenner H, et al. Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study[J]. *Lancet Oncol*, 2010, 11(2): 165-173. DOI: 10.1016/S1470-2045(09)70335-3.
- Yang G, Zheng W, Sun QR, et al. Pathologic features of initial adenomas as predictors for metachronous adenomas of the rectum[J]. *J Natl Cancer Inst*, 1998, 90(21): 1661-1665. DOI: 10.1093/jnci/90.21.1661.
- Chen H, Li N, Ren J, et al. Participation and yield of a population-based colorectal cancer screening programme in China[J]. *Gut*, 2019, 68(8): 1450-1457. DOI: 10.1136/gutjnl-2018-317124.
- Gong Y, Peng P, Bao P, et al. The implementation and first-round results of a community-based colorectal cancer screening program in Shanghai, China[J]. *Oncologist*, 2018, 23(8): 928-935. DOI: 10.1634/theoncologist.2017-0451.
- Zhiqiang F, Jie C, Yuqiang N, et al. Analysis of population-based colorectal cancer screening in Guangzhou, 2011-2015[J]. *Cancer Med*, 2019, 8(5): 2496-2502. DOI: 10.1002/cam4.1867.
- 中华医学会消化内镜学分会中国抗癌协会肿瘤内镜学专业委员会. 中国早期结直肠癌筛查及内镜诊治指南(2014 年, 北京)[J]. *中华消化内镜杂志*, 2015, 32(6): 341-360. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-5232.2015.06.001.
- Arnold M, Sierra MS, Laversanne M, et al. Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality[J]. *Gut*, 2017, 66(4): 683-691. DOI: 10.1136/gutjnl-2015-310912.
- Kaminski MF, Regula J, Kraszewska E, et al. Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer[J]. *N Engl J Med*, 2010, 362(19): 1795-1803. DOI: 10.1056/NEJMoa0907667.
- Corley DA, Jensen CD, Marks AR, et al. Adenoma detection rate and risk of colorectal cancer and death[J]. *N Engl J Med*, 2014, 370(14): 1298-1306. DOI: 10.1056/NEJMoa1309086.
- Sanduleanu S, le Clercq CM, Dekker E, et al. Definition and taxonomy of interval colorectal cancers: a proposal for standardising nomenclature[J]. *Gut*, 2015, 64(8): 1257-1267. DOI: 10.1136/gutjnl-2014-307992.
- Rutter MD, Beintaris I, Valori R, et al. World Endoscopy Organization consensus statements on post-colonoscopy and post-imaging colorectal cancer[J]. *Gastroenterology*, 2018, 155(3): 909-925.e3. DOI: 10.1053/j.gastro.2018.05.038.
- Li X, Qian M, Zhao G, et al. The performance of a community-based colorectal cancer screening program: evidence from Shanghai Pudong New Area, China[J]. *Prev Med*, 2019, 118: 243-250. DOI: 10.1016/j.ypmed.2018.11.002.
- Sung JJ, Ng SC, Chan FK, et al. An updated Asia Pacific consensus recommendations on colorectal cancer screening[J]. *Gut*, 2015, 64(1): 121-132. DOI: 10.1136/gutjnl-2013-306503.
- Young GP, Rabeneck L, Winawer SJ. The global paradigm shift in screening for colorectal cancer[J]. *Gastroenterology*, 2019, 156(4): 843-851.e2. DOI: 10.1053/j.gastro.2019.02.006.
- Wolf A, Fontham E, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society[J]. *CA Cancer J Clin*, 2018, 68(4): 250-281. DOI: 10.3322/caac.21457.
- 杜灵彬, 李辉章, 王悠清, 等. 2013 年中国结直肠癌发病与死亡分析[J]. *中华肿瘤杂志*, 2017, 39(9): 701-706. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3766.2017.09.012.
- 王洛伟, 辛磊, 林寒, 等. 中国消化内镜技术发展现状[J]. *中华消化内镜杂志*, 2015, 32(8): 501-515. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-5232.2015.08.001.
- Lui RN, Tsoi K, Ho J, et al. Global increasing incidence of young-onset colorectal cancer across 5 continents: a joinpoint regression analysis of 1,922,167 cases[J]. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*, 2019, 28(8): 1275-1282. DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-18-1111.
- Sung J, Chiu HM, Jung KW, et al. Increasing trend in young-onset colorectal cancer in Asia: more cancers in men and more rectal cancers[J]. *Am J Gastroenterol*, 2019, 114(2): 322-329. DOI: 10.14309/ajg.000000000000133.
- 黄秋驰, 叶丁, 蒋曦依, 等. 人群结直肠癌筛查项目成本效果分析与评价[J]. *中华流行病学杂志*, 2017, 38(1): 65-68.

- DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2017.01.012.
- [29] Bai Y, Xu C, Zou DW, et al. Diagnostic accuracy of features predicting lower gastrointestinal malignancy: a colonoscopy database review of 10,603 Chinese patients[J]. *Colorectal Dis*, 2011, 13(6): 658-662. DOI: 10.1111 / j.1463-1318.2010.02251.x.
- [30] Cai SR, Zhang SZ, Zhu HH, et al. Performance of a colorectal cancer screening protocol in an economically and medically underserved population[J]. *Cancer Prev Res (Phila)*, 2011, 4(10):1572-1579. DOI: 10.1158/1940-6207.CAPR-10-0377.
- [31] Cai SR, Huang YQ, Zhang SZ, et al. Effects of subitems in the colorectal cancer screening protocol on the Chinese colorectal cancer screening program: an analysis based on natural community screening results[J]. *BMC Cancer*, 2019, 19(1):47. DOI: 10.1186/s12885-018-5191-y.
- [32] Wu WM, Wang Y, Jiang HR, et al. Colorectal cancer screening modalities in Chinese population: practice and lessons in Pudong New Area of Shanghai, China[J]. *Front Oncol*, 2019, 9:399. DOI: 10.3389/fonc.2019.00399.
- [33] Yeoh KG, Ho KY, Chiu HM, et al. The Asia-Pacific colorectal screening score: a validated tool that stratifies risk for colorectal advanced neoplasia in asymptomatic Asian subjects [J]. *Gut*, 2011, 60(9): 1236-1241. DOI: 10.1136 / gut.2010.221168.
- [34] Wong MC, Ching JY, Ng S, et al. The discriminatory capability of existing scores to predict advanced colorectal neoplasia: a prospective colonoscopy study of 5,899 screening participants[J]. *Sci Rep*, 2016, 6: 20080. DOI: 10.1038 / srep20080.
- [35] Li W, Zhang L, Hao J, et al. Validity of APCS score as a risk prediction score for advanced colorectal neoplasia in Chinese asymptomatic subjects: a prospective colonoscopy study[J]. *Medicine (Baltimore)*, 2016, 95(41): e5123. DOI: 10.1097 / MD.0000000000005123.
- [36] Wong MC, Lam TY, Tsoi KK, et al. A validated tool to predict colorectal neoplasia and inform screening choice for asymptomatic subjects[J]. *Gut*, 2014, 63(7): 1130-1136. DOI: 10.1136/gutjnl-2013-305639.
- [37] Shaikat A, Mongin SJ, Geisser MS, et al. Long-term mortality after screening for colorectal cancer[J]. *N Engl J Med*, 2013, 369(12):1106-1114. DOI: 10.1056/NEJMoa1300720.
- [38] Brenner H, Tao S. Superior diagnostic performance of faecal immunochemical tests for haemoglobin in a head-to-head comparison with guaiac based faecal occult blood test among 2235 participants of screening colonoscopy[J]. *Eur J Cancer*, 2013, 49(14):3049-3054. DOI: 10.1016/j.ejca.2013.04.023.
- [39] Li S, Wang H, Hu J, et al. New immunochemical fecal occult blood test with two-consecutive stool sample testing is a cost-effective approach for colon cancer screening: results of a prospective multicenter study in Chinese patients[J]. *Int J Cancer*, 2006, 118(12):3078-3083. DOI: 10.1002/ijc.21774.
- [40] Cai SR, Zhu HH, Huang YQ, et al. Cost-effectiveness between double and single fecal immunochemical test(s) in a mass colorectal cancer screening[J]. *Biomed Res Int*, 2016, 2016: 6830713. DOI: 10.1155/2016/6830713.
- [41] Huang Y, Li Q, Ge W, et al. Optimizing sampling device for the fecal immunochemical test increases colonoscopy yields in colorectal cancer screening[J]. *Eur J Cancer Prev*, 2016, 25(2): 115-122. DOI: 10.1097/CEJ.0000000000000154.
- [42] Allison JE, Fraser CG, Halloran SP, et al. Population screening for colorectal cancer means getting FIT: the past, present, and future of colorectal cancer screening using the fecal immunochemical test for hemoglobin (FIT)[J]. *Gut Liver*, 2014, 8(2):117-130. DOI: 10.5009/gnl.2014.8.2.117.
- [43] Lee JK, Liles EG, Bent S, et al. Accuracy of fecal immunochemical tests for colorectal cancer: systematic review and meta-analysis[J]. *Ann Intern Med*, 2014, 160(3):171. DOI: 10.7326/M13-1484.
- [44] Katsoula A, Paschos P, Haidich AB, et al. Diagnostic accuracy of fecal immunochemical test in patients at increased risk for colorectal cancer: a meta-analysis[J]. *JAMA Intern Med*, 2017, 177(8): 1110-1118. DOI: 10.1001 / jamainternmed.2017.2309.
- [45] Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening[J]. *N Engl J Med*, 2014, 370(14): 1287-1297. DOI: 10.1056 / NEJMoa1311194.
- [46] 国家食品药品监督管理总局医疗器械技术评审中心. 体外诊断试剂产品注册技术评审报告:人类SDC2基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法)(CSZ1800035)[R/OL]. [2019-8-1]. <https://www.cmde.org.cn/CL0116/8094.html>.
- [47] 柏愚, 刘晶, 康倩, 等. 联合检测SDC2和SFRP2甲基化在结肠直肠癌筛查中的价值[J]. *中华消化内镜杂志*, 2019, 36(6): 427-432. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-5232.2019.06.009.
- [48] Winawer SJ, Zauber AG, Ho MN, et al. Prevention of colorectal cancer by colonoscopic polypectomy. The National Polyp Study Workgroup[J]. *N Engl J Med*, 1993, 329(27): 1977-1981. DOI: 10.1056/NEJM199312303292701.
- [49] Zauber AG, Winawer SJ, O'Brien MJ, et al. Colonoscopic polypectomy and long-term prevention of colorectal-cancer deaths[J]. *N Engl J Med*, 2012, 366(8):687-696. DOI: 10.1056/NEJMoa1100370.
- [50] Zhao S, Wang S, Pan P, et al. Magnitude, risk factors, and factors associated with adenoma miss rate of tandem colonoscopy: a systematic review and meta-analysis[J]. *Gastroenterology*, 2019, 156(6):1661-1674.e11. DOI: 10.1053 / j.gastro.2019.01.260.
- [51] The Lancet Gastroenterology Hepatology. Improving uptake of colorectal cancer screening[J]. *Lancet Gastroenterol Hepatol*, 2017, 2(11): 767. DOI: 10.1016/S2468-1253(17)30298-4.
- [52] McCarthy M. US colorectal cancer screening rates are "far too low," says CDC[J]. *BMJ*, 2013, 347:f6729. DOI: 10.1136/bmj.f6729.
- [53] Seeff LC, Manninen DL, Dong FB, et al. Is there endoscopic capacity to provide colorectal cancer screening to the unscreened population in the United States? [J]. *Gastroenterology*, 2004, 127(6): 1661-1669. DOI: 10.1053 / j.gastro.2004.09.052.
- [54] Atkin W, Wooldrage K, Parkin DM, et al. Long term effects of once-only flexible sigmoidoscopy screening after 17 years of follow-up: the UK flexible sigmoidoscopy screening randomised controlled trial[J]. *Lancet*, 2017, 389(10076): 1299-1311. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)30396-3.
- [55] Bai Y, Gao J, Zou DW, et al. Distribution trends of colorectal adenoma and cancer: a colonoscopy database analysis of 11, 025 Chinese patients[J]. *J Gastroenterol Hepatol*, 2010, 25(10): 1668-1673. DOI: 10.1111/j.1440-1746.2010.06414.x.
- [56] Spada C, Stoker J, Alarcon O, et al. Clinical indications for computed tomographic colonography: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) guideline [J]. *Endoscopy*, 2014, 46(10): 897-915. DOI: 10.1055 /

附表 2 伺机筛查风险问卷

以下 6 种情况之一,可作为高危个体
一、有消化道症状,如便血、黏液便及腹痛者;不明原因贫血或体重下降
二、曾有结直肠癌病史者
三、曾有结直肠癌前疾病者(如结直肠腺瘤、溃疡性结肠炎、克罗恩病、血吸虫病等)
四、结直肠癌家族史的直系亲属
五、有结直肠息肉家族史的直系亲属
六、有盆腔放疗史者

附表 3 无症状人群结直肠筛查评分

项目	APCS 评分		APCS 评分(修订版)		结直肠肿瘤预测评分	
	标准	分值	标准	分值	标准	分值
风险因素						
年龄	<50 岁	0	40~49 岁	0	50~55 岁	0
	50~69 岁	2	50~59 岁	1	56~70 岁	1
	≥70 岁	3	≥60 岁	2		
性别	女	0	女	0	女	0
	男	1	男	1	男	1
家族史	无	0	无	0	无	0
	一级亲属患 CRC	2	一级亲属患 CRC	1	一级亲属患 CRC	1
吸烟	不吸烟	0	不吸烟	0	不吸烟	0
	当前或过去吸烟	1	当前或过去吸烟	1	当前或过去吸烟	1
体重指数	/	/	<23 kg/m ²	0	<25 kg/m ²	0
			≥23 kg/m ²	1	≥25 kg/m ²	1
			/	/	无自诉糖尿病	0
自诉糖尿病	/	/	/	/	自诉糖尿病	1
风险分层	低风险	0~1	低风险 ^a	0	低风险 ^a	0~2
	中等风险	2~3	中等风险	1~3	高风险	3~6
	高风险	4~7	高风险	4~6		
风险预测	结直肠癌和进展期腺瘤风险		结直肠癌和进展期腺瘤风险		结直肠腺瘤、进展期腺瘤和结直肠癌的总体风险	

注: APCS 为亚太结直肠筛查评分; CRC 为结直肠癌; “/”代表该评分中无此条目; “原文中表达为“average risk”, 此处译为“低风险”

·读者·作者·编者·

关于关键词的标引

本刊要求论著类文章需标引 2~5 个关键词。请使用中国医学科学院医学信息研究所的《中文医学主题词表》(CmeSH) 所列的词, 或登录万方医学网: <http://med.wanfangdata.com.cn/Mesh/Mesh.aspx> 查找。如果查不到相应

的关键词, 处理办法有: (1) 可选用直接相关的几个主题词进行组配。(2) 可根据树状结构表选用最直接的上位主题词。(3) 必要时, 可采用习用的自由词并列于最后。每个英文关键词第一个字母大写, 各词汇之间空 2 个字。